

¿Qué pasa con mi compañero?

Su compañero también debe recibir tratamiento. Aunque él o ella no tenga síntomas, ellos deben recibir tratamiento para asegurarse de que la infección no vuelva. Su compañero **no debe tomar bebidas o medicamentos que contengan alcohol** durante el tratamiento y hasta un día después de que termine el tratamiento.

Usted y su compañero deben tomar cada uno su propio medicamento.

¿Puedo seguir teniendo relaciones sexuales?

Usted **puede** tener relaciones sexuales. Se recomienda el uso de condones hasta que usted y sus parejas hayan terminado el tratamiento.

¿Es peligrosa la tricomoniasis?

Por lo general, la tricomoniasis no es peligrosa. A veces puede causar otros problemas de salud. Esto es muy poco frecuente.

Inflamación pélvica

Hay una pequeña probabilidad de que la tricomoniasis cause infección de las trompas de Falopio. Esta infección se llama inflamación pélvica (o PID, por sus siglas en inglés) y puede afectar su capacidad de tener niños. El tratamiento oportuno puede evitar los daños. Vaya al departamento local de salud o a proveeder de asistencia médica tan pronto como tenga síntomas de inflamación pélvica (dolor o molestias en el bajo abdomen, el cuello de la matriz o el útero; fiebre; escalofríos).

La infección con tricomoniasis también puede facilitar que usted se infecte con VIH.

¿Cómo puedo protegerme?


- ✦ Limite el número de personas con quienes tiene relaciones sexuales. Mientras mayor sea el número de personas con quienes tiene relaciones sexuales, más probable es que contraiga tricomoniasis.
- ✦ Si no quiere embarazarse, use condones de látex o poliuretano cuando tenga relaciones sexuales.

Si tiene problemas o preguntas, llame al departamento de salud o a su proveedor de asistencia médica.



Estado de Carolina del Norte
Departamento de Salud y Servicios Humanos,
División de Salud Pública
www.ncdhhs.gov/espanol

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte es un empleador y proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Rev. 5/15 ©



Tricomoniasis

¿Qué es la tricomoniasis?

La tricomoniasis es una infección de la vagina y del pene. Es causada por un microorganismo llamado *Trichomonas vaginalis*. La tricomoniasis (también conocida como "trick" en inglés) es una infección muy común. Mientras más compañeros sexuales tenga, más probable es que contraiga tricomoniasis.

¿Cómo contrae la tricomoniasis?

Tanto las mujeres como los hombres por lo general se contagian con tricomoniasis con el acto sexual. Es fácil que los compañeros sexuales se infecten.

¿Cuáles son los síntomas de la tricomoniasis?

Los síntomas de la infección de tricomoniasis por lo general aparecen una semana después del contacto con la persona infectada. En algunos casos, los síntomas aparecen entre 3 y 28 días después del contacto.

Síntomas en las mujeres

- ✦ Flujo espumoso de la vagina; puede ser verde-amarillento o gris.
- ✦ Flujo con mal olor; pudiera oler a pescado.
- ✦ Picazón y ardor de ligero a intenso alrededor de la vagina.
- ✦ Enrojecimiento dentro y alrededor de la vagina.
- ✦ Las relaciones sexuales pueden doler.
- ✦ Orinar puede doler.

Unas mujeres no tienen síntomas cuando tienen la infección de tricomoniasis.

Síntomas en los hombres

- ✦ Flujo ligero, especialmente antes de orinar en la mañana.
- ✦ Leve picazón o irritación del pene.
- ✦ Las relaciones sexuales pueden doler.
- ✦ Puede haber ardor inmediatamente después del acto sexual.

Muchos hombres infectados carecen de síntomas. Sin embargo, los hombres deben consultar a un médico o una enfermera si su compañera tiene síntomas.

Si usted tiene estos síntomas . . .

Si usted tiene alguno de estos síntomas, consulte con su proveedor de asistencia médica. Puede ser necesario que le examinen el área genital y que le tomen muestras del flujo de la vagina o del pene. Esto le permitirá al médico o a la enfermera, determinar si tiene tricomoniasis.

¿Cuál es el tratamiento contra la tricomoniasis?

El tratamiento contra la tricomoniasis se hace con un medicamento llamado metronidazol (que se vende como Flagyl o Protostat).

Si está embarazada, dígaselo a su proveedor de asistencia médica.

¿Qué hacer con el medicamento?

Tómese todo el medicamento. Puede comenzar a sentirse bien después de varios días, **pero es necesario que se tome todo el medicamento para curar la infección.**

Sólo usted debe tomar el medicamento que le recetaron.

Si el medicamento es metronidazol (Flagyl o Protostat), hay cosas que debe saber:

- ✦ **No beba cerveza, vino, licor, ni alcohol de ningún tipo** mientras esté tomando el medicamento y hasta un día después de terminar de tomarlo. Beber alcohol y tomar estos medicamentos puede causar náuseas intensas, aceleración del pulso y sofocos. Algunos jarabes para la tos y medicamentos sin receta contienen alcohol. Consulte a su proveedor de asistencia médica antes de tomar cualquier otro medicamento.
- ✦ Es posible que tenga un sabor metálico en la boca. Esto desaparece cuando termina de tomar el medicamento.
- ✦ La orina puede salirle más oscura.
- ✦ Puede producirse una infección de candidiasis. Su proveedor de asistencia médica puede darle otro medicamento si tiene problemas de candidiasis.
- ✦ Si tiene vómitos, mareos intensos, urticaria, ataques o adormecimiento en las manos o los pies, deje de tomar el medicamento y comuníquese con su proveedor de asistencia médica.